WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C07J 41/00, A61K 31/575, 9/127, C12N 15/63, C07C 271/20, 279/14, 237/08, A61K 31/325, 31/16, 31/155

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/05678

A2

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

12, Februar 1998 (12.02.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE97/01669

(22) Internationales Anmeldedatum: 1. August 1997 (01.08.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 31 189.6

2, August 1996 (02.08.96)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MAX-DELBRÜCK-CENTRUM FÜR MOLEKULARE MEDIZIN [DE/DE]; Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).

SCHNEIDER, Manfred (71)(72) Anmelder und Erfinder: [DE/DE]; Triebelsheider Weg 47, D-42111 Wuppertal (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KEIL, Oliver [DE/DE]; Krotscheiderweg 52, D-42327 Wuppertal (DE). RESZKA, Regina [DE/DE]; Goethestrasse 23, D-16341 Schwanebeck (DE). GROTH, Detlef [DE/DE]; Neue Scheune 5, D-14548 Ferch (DE).
- (74) Anwalt: BAUMBACH, Fritz; BioTez Berlin-Buch GmbH, Patentstelle, Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT. SE).

Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(54) Title: NOVEL CATIONIC AMPHIPHILIC LIPIDS FOR LIPOSOMAL GENE TRANSFER

(54) Bezeichnung: NEUARTIGE KATIONISCHE AMPHIPHILE FÜR DEN LIPOSOMALEN GENTRANSFER

(57) Abstract

The synthesis of novel cationic, amphiphilic lipids is disclosed, as well as their use as gene transfer vesicles in vitro and in vivo. A series of different lipids (diglycerides, steroids) was synthesised by modification with variable cationic molecules (amino acids, biogenic amines). Because of their ability to form complexes with polynucleotides (DNA, RNA, antisense oligonucleotides, ribozymes, etc.), compounds of this type are useful as vectors for gene transfer (transfection).

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Synthese neuartiger kationischer, amphiphiler Lipide und deren Anwendung als Gentransfervesikel in vitro und in vivo. Dazu wurden eine Reihe unterschiedlicher Lipide (Diglyceride, Steroide) durch Modifizierung mit variablen kationischen Molekülen (Aminosäuren, biogene Amine) synthetisiert. Verbindungen dieser Art eignen sich, aufgrund ihrer Fähigkeit mit Polynukleotiden (DNS, RNS, Antisense Oligonukleotide, Ribozyme usw.) zu komplexieren, als Vektoren für den Gentransfer (Transfek-

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco **.	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CII	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawicn
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	L	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Neuartige kationische Amphiphile für den liposomalen Gentransfer Beschreibung

Die Erfindung betrifft kationische Lipide der allgemeinen Formel I,

]

wobei n=2,3,4,6,8 und m=2,3,6,8 sein kann und R_1 = H, CH_3 , CH_2CH_2OH ; R_2 = H, CH_3 , CH_2CH_2OH , $(CH_2)_3N^+(R_1)_3$, R_3 einen geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Rest C_7 - C_{21} , Z = CH_2 , O, NH, Y = CH_2 , O, NH und X = CI, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet;

kationische Lipide der Formel II,

$$R_2$$
 Z
 Z
 Z
 R_2
 R_2

II

wobei R_1 einen aliphatischen, aromatischen oder heteroaliphatischen α -C-Atom-Substituenten der α -Aminosäuren Glycin, Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Phenylalanin, Tyrosin, Prolin, Hydroxyprolin, Serin, Threonin, Cystein, Cystin, Methionin, Tryptophan, Arginin, Lysin, Ornithin, Histidin, R_2 einen geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Rest C_7 - C_{21} , X = Cl, Br, I, CH₃COO, CF₃COO, $Y = CH_2$, O, NH und $Z = CH_2$, O, NH bedeutet;

kationische Lipide der allgemeinen Formel III,

$$R_3$$
 NH_2^+X
 CH
 R_1
 R_2
 O
 R_2
 R_2

 \mathbf{H}

wobei R_1 = H, CH_3 , $(CH_2)_3NH_2^+X^-(CH_2)_3NH_3^+X^-$, R_3 = H, $(CH_2)_3NH_3^+X^-$, R_2 einen geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Rest C_7 - C_{21} und X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet;

kationische Lipide der allgemeinen Formel IV,

wobei n=1-4 sein kann und R einen geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Rest C_7-C_{21} , $Y=CH_2$, O, NH, $Z=CH_2$, O, NH und X=Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet;

kationische Lipide der allgemeinen Formel V,

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ H \\ K_{1} \\ R_{2} \\ R_{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ H \\ H \\ H \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R_{1} \\ K_{1} \\ R_{1} \\ R_{1} \end{array}$$

wobei n=2,3,4,6,8 und m=2,3,6,8 sein kann und R_1 = H, CH₃, CH₂CH₂OH; R_2 = H, CH₃, CH₂CH₂OH, (CH₂)₃N⁺(R_1)₃ und X = Cl, Br, I, CH₃COO, CF₃COO bedeutet;

kationische Lipide der allgemeinen Formel VI,

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{4} \\ NH_{2}^{+}X \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ H \\ H \end{array}$$

$$\begin{array}{c} VI \\ VI \end{array}$$

wobei $R_1 = H$, CH_3 , $(CH_2)_3NH_2^+X^-(CH_2)_3NH_3^+X^-$, $(CH_2)_3NH_3^+X^-$. $R_2 = H$, $(CH_2)_3NH_3^+X^-$ und X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet;

kationische Lipide der allgemeinen Formel VII,

$$Y-(CH_2)_m-NH$$

VII

wobei m=2-6 sein kann und Y eine Gruppe $N(R)_3^+X^-$ mit R = H, CH_3 , $(CH_2)_2OH$ oder eine Gruppe $NH-C(NH_2^+X^-)NH_2$ mit X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet; kationische Lipide der allgemeinen Formel VIII,

wobei Y eine Gruppe $N(R)_3^+X^-$ mit R = H, CH_3 , $(CH_2)_2OH$ oder eine Gruppe $NH-C(NH_2^+X^-)NH_2$ mit X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet;

kationische Lipide der allgemeinen Formel IX und X,

wobei n=2,3,4,6,8 und m=2,3,6,8 sein kann und R_1 = H, CH_3 , CH_2CH_2OH ; R_2 = H, CH_3 , CH_2CH_2OH , $(CH_2)_3N^+(R_1)_3$, R = H, CH_3 , $(CH_2)_2OH$, Y eine Gruppe Carbonyl (=0 (Östron)) oder eine Gruppe OH (Östradiol), Z eine Gruppe $N(R)_3^+X^-$ mit R = H, CH_3 , $(CH_2)_2OH$ oder eine Gruppe $NH-C(NH_2^+X^-)NH_2$ und X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

Kationische Lipide der allgemeinen Formel I-X sind geeignete Reagenzien für den liposomalen Gentransfer (Transfektion). Anwendungsgebiete derartiger Transfektionsreagenzien liegen in der Medizin und in der Gentechnik.

Das Einbringen genetischen Materials in eukaryontische Zellen ist ein grundlegendes Verfahren zum Studium biologischer Funktionen und von zunehmender Bedeutung für die gentherapeutische Behandlung verschiedener Erkrankungen, von denen die Tumoren an erster Stelle zu nennen sind.

Man unterscheidet hierbei biologische, physikalische und physikochemische Methoden für den Transfer von DNA, RNA und Proteinen in die Zielzelle [Wagner J, Madry, H., Reszka, R (1995). In vivo gene transfer: focus on the kidney. Nephrol. Dial. Transplant 10:1801-1807 Zhu J, Zhang L, Hanisch U-K, Felgner PL,. Reszka R (1996). In vivo gene therapy of experimental brain tumors by continuous administration of DNA-liposome complexes. Gene Therapy 3: 472-476, Kiehntopf, M., Brach MA & Hermann F (1995). Gentherapie in der Onkologie: Perspektiven, Chancen und Risiken. Onkologie 18 (Sonderheft): 16-26]. Physikalische Methoden wie Elektroporation und Mikroinjektion sind nur für den ex vivo und in vitro Transfer geeignet. Die sogenannte "Jet"- Injektions-Methode läßt sich darüberhinaus auch für den in vivo Gentransfer anwenden (Leber, Haut). Physikochemische Methoden wie Kalziumphosphatpräzipitationstechnik (KPP)- und DEAE-Dextran-Transfektion, sind auf in vitro und ex vivo Anwendungen begrenzt. Der zur Zeit in einer Reihe von klinischen Studien (Phase I/II) erprobte retrovirale Gentransfer mit Hilfe virusproduzierender Zellen ist durch eine längeranhaltende, aber relativ niedrige Genexpression in sich teilende Zellen gekennzeichnet. Problematisch beim retroviralen Gentransfer ist vor allem die Entwicklung einer spezifischen Immunantwort gegen die implantierten virusproduzierenden Helferzellen. die Möglichkeit der Generierung replikationskompetenter Viren und die Gefahr einer Aktivierung von zellulären Onkogenen bzw. Inaktivierung von Suppressorgenen als Resultat der zufälligen Lokalisation der Geninsertion. Die notwendigen umfangreichen zellbiologischen und medizinischen Vorarbeiten und die aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen lassen hohe Kosten bei der klinischen Anwendung des retroviralen Gentransfers erwarten.

Vektoren auf der Basis von Adenoviren sind ebenfalls aussichtsreiche Gentransfervehikel. Diese erreichen hohe Transfektionsraten auch in sich nicht teilendem Gewebe. Da die DNA nicht in das Genom integriert wird, ist die Dauer der Fremdgenexpression begrenzt und einer

wiederholten Anwendung in vivo steht die starke spezifische Immunantwort des Wirtsorganismus bei wiederholten Applikationen entgegen.

Der liposomal vermittelte Gentransfer hat dagegen in den letzten Jahren auch für *in vivo* Anwendungen an Bedeutung gewonnen. Die Genkonstrukte lassen sich entweder in die Liposomen verkapseln oder werden mit der Membran assoziiert. Liposomale Präparationen zeichnen sich durch eine einfache Handhabung, geringe Immunreaktivität und damit wiederholbare Anwendbarkeit bei niedrigem Sicherheitsrisiko für Anwender und "Empfänger" aus. Noch am Anfang steht die Anwendung von Immunoliposomen als Transportvehikel für genetisches Material.

Ein ebenfalls interessanter Ansatz ist die Verwendung fusogener Liposomen, die in ihrem Inneren einen Komplex aus DNA und Kernprotein (HMG I) tragen [Kaneda, Iwai, K., Uchida, T(1989). Increased expression of DNA cointroduced with nuclear protein in adult rat liver Science 243, 375-378, Kaneda Y, Kato, K., Nakanishi, M., Uchida, T.(1996) Introduction of plasmid DNA and nuclear protein into cells by using erythrocyte ghosts, liposomes, and Sendai virus. Methods-Enzymol. 221:317-327].

Seit einigen Jahren werden kationische Liposomen für den Transfer von DNA (Felgner PL, Gadek TR, Holm M et al. (1987). Lipofection: a highly efficient, lipid-mediated DNA transfection procedure. Proc Natl Acad Sci USA 84:7413-7417, Felgner JH, Kumar R, Sridhar CN et al. (1994). Enhanced gene delivery and mechanism studies with a novel series of cationic lipid formulations. J Biol Chem 269:2550-2561), Antisense-Oligomeren, Proteinen und Ribozymen mit Erfolg eingesetzt. DNA wird dabei über elektrostatische Wechselwirkungen mit der Membran der Liposomen assoziiert und über einen bisher noch unvollständig verstandenen Mechanismus in die Zielzelle transferiert. Die Transferrate in vitro ist dabei in Abhängigkeit von der Zellinie mit der Effizienz des retroviralen Gentransfer vergleichbar. Zur Zeit befinden sich die ersten kationischen Liposomen/DNA/Komplexe [DMRIE/DOPE und DOTMA/DOPE (Lipofectin, Gibco BRL USA) sowie DC-Chol/DOPE] in einer klinischen Phase I/II Prüfung (Gao, X., Huang, L. (1995) Cationic liposome-mediated gene transfer. Gene Therapy 2:710-722).

Kationische, amphiphile Moleküle, bestehend aus einem Lipidteil (Steroid-oder Diglycerid-Gerüst) und einer positiv geladenen Kopfgruppe (Ammonium-Ionen) sind in der Lage, entweder spontan oder nach Zusatz eines Hilfslipids (Dioleoylphosphatidylethanolamin (DOPE)) Liposomen auszubilden. DNA wird dabei über elektrostatische Wechselwirkungen mit der Membran der Liposomen assoziiert und über einen bisher noch unvollständig verstandenen Mechanismus in die Zielzelle transferiert.

Für einen möglichst effizienten in vitro und in vivo Gentransfer sollten die zur Generierung der Liposomen verwendeten kationischen Lipide die folgenden Kriterien erfüllen:

I. Sie sollten nicht toxisch und biologisch abbaubar sein und keine Immunreaktionen hervorrufen

 Sie sollten möglichst effizient mit der DNA komplexieren, diese vor Abbaureaktionen schützen und hohe Transferraten aufweisen

- 3. Sie sollten Zellen rezeptorspezifisch transfizieren
- Sie müssen leicht und in größeren Mengen synthetisiert werden können

Sowohl die Syntheseverfahren als auch die Moleküle selbst der bislang in der Literatur beschriebenen kationischen Amphiphile weisen eine Reihe von Nachteilen auf. Die Synthese der kommerzialisierten Transfektionsreagenzien DOTMA (Lipofektin), DOGS und DOSPA verläuft über viele Stufen mit zum Teil sehr geringen Ausbeuten und die Aufreinigung der Produkte erfordert eine aufwendige säulenchromatographische Reinigung. Bei vielen Verbindungen wie z.B. DOTMA, DMRIE und DOSPA sind die kationischen Kopfgruppen mit langkettigen Fettalkoholen über Etherbindungen verknüpft, welche eine sehr schlecht biologische Abbaubarkeit und somit eine hohe Toxizität des Moleküls zur Folge haben.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, neuartige kationische Lipide zu finden, welche im Vergleich mit den bislang bekannten Verbindungen höhere Gentransferraten und geringere Toxizitäten aufweisen. Weiterhin liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, Verfahren zu finden, welche die Synthese der kationischen Lipide in wenigen Reaktionsstufen und mit hohen Ausbeuten ermöglicht.

Diese Aufgaben wurde gemäß den Ansprüchen I-IX gelöst. Mit den neuartigen kationischen Lipiden der Formeln I-XI werden Verbindungen zur Verfügung gestellt, die den Anforderungen der Aufgabenstellung entsprechen. So wird z.B. in Abbildung 2-6 an unterschiedlichen Tumorzellinien gezeigt, daß die aus den Lipiden SP-Chol, O-Chol, Put-Chol und DOSGA und dem Helferlipid Dioleoylphosphatidylethanolamin (DOPE) (in den beschriebenen molaren Verhältnissen) hergestellten Liposomen im Vergleich zu DC-Chol/DOPE Vesikel deutlich höher transfizieren in Abwesenheit von Serum. An der Ratten-Kolonkarzinomlinie CC531 (Abb.3) transfizieren SP-Chol und O-Chol/DOPE signifikant höher als DC-Chol/DOPE bei einem 5%igem Serumanteil. Besonders überraschend sind die in Abb 5 und 6 gezeigen hohen Transferraten, die unter Verwendung von DOSGA/DOPE-Liposomen bei einem 5%igem Serumanteil an humanen und Rattenglioblastomzellen (N64, F98) gewonnen wurden. Auch sind SP-Chol/DOPE-Liposomen in serumhaltigen Medium sehr gut geeignet, humane Brusttumorzellen (MaTu) zu transfizieren (Abb. 1) Zuordnung der Lipide:

Verbindungsklasse
1B[N-(N',N'-Dimethylaminoethan)-carbamoyl]cholesterol
V Beispiel 4
VII Beispiel 4
VI Beispiel 5
IV Beispiel 3

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen erfolgt gemäß den beigefügten Schemata.

Schema I beschreibt das Verfahren zur Herstellung neuartiger kationischer Lipide mit 1,3-Diglycerid-Grundgerüst an denen die kationische Kopfgruppe über einen Carboxylat-Spacer angeknüpft ist.

Schema II beschreibt das Verfahren zur Synthese 1,3-Diglycerid-modifizierter Aminosäuren.

Schema III beschreibt das Verfahren zur Synthese 1,3-Diglycerid-modifizierter Guanidin-Derivate.

Schema IV beschreibt das Verfahren zur Synthese neuartiger Cholesterol-Derivate mit biogenen Aminen als kationischen Kopfgruppen.

Schema V beschreibt das Verfahren zur Synthese Aminosäure-modifizierter Cholesterol-Derivate.

Schema VI beschreibt das Verfahren zur Synthese Glucosamin-modifizierter Cholesterol-Derivate.

Schema VII beschreibt das Verfahren zur Synthese kationisch-modifizierter Oestradiol-Derivate.

Schema VIII beschreibt das Verfahren zur Synthese kationisch-modifizierter Oestron-Derivate.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, das es nunmehr möglich ist, durch die beschriebenen Verfahren unter kostengünstigen Bedingungen und unter Verwendung preiswerter Chemikalien Transfektionsreagenzien zu synthetisieren, welche eine unerwartet hohe Gentransferrate und eine gute biologische Abbaubarkeit aufweisen.

Die Erfindung soll nachfolgend durch Ausführungsbeispiele näher erläutert werden.

Ausführungsbeispiele

Beispiel 1

Herstellung von 2-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-ammoniumtetraazadecan))-1,3-dioleoyloxy-propan-tri-trifluoracetat I

247 μl (1 mmol) 1,3-Dibenzyloxy-2-propanol wurden mit 7 ml einer 20%igen Lösung von Phosgen in Toluol versetzt und 48 h bei RT gerührt. Nach dieser Zeit wurde überschüssiges Phosgen mit Argon ausgetrieben und der Ansatz zu einer Lösung von 302 mg (0.6 mmol) N^1 , N^{10} , N^{14} -tris-BOC-spermin und 300 μl Triethylamin in 5 ml Methylenchlorid zugetropft und für 4 h bei RT gerührt. Anschließende Säulenchromatographische Reinigung (Kieselgel 60) ergaben 375 mg (47%) 2-(N^5 -carbamoyl-(N^1 , N^{10} , N^{14} -tris-BOC-tetraazadecan))-1,3-dibenzyloxy-propanol (zähes Öl).

670 mg (0.84 mmol) 2-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-tris-BOC-tetraazadecan))-1,3-dibenzyloxy-propanol wurden daraufhin in 25 ml Ethanol gelöst, mit 150 mg Pd/C (5%) versetzt und 24 h hydriert. Nach Absaugen des Katalysators erhielt man 520 mg (100%) 2-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-tris-BOC-tetraazadecan))-1,3-propantriol (zähes Öl).

472 mg (0.76 mmol) 2-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-tris-BOC-tetraazadecan))-1,3-propantriol wurden mit 452 mg (1.6 mmol) Ölsäure, 334 mg (1.62 mmol) DCC und 20 mg DMAP in 30 ml Methylenchlorid gelöst und 24 h bei RT gerührt. Anschließende Säulenchromatographische Reinigung (Kieselgel 60) ergaben 457 mg (52%) 2-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-tris-BOC-tetraazadecan))-1,3-dioleoyloxy-propan (zähes Öl).

200 mg (0.17 mmol) 2-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-tris-BOC-tetraazadecan))-1,3-dioleoyloxy-propan wurden mit 3 ml TFA/CH₂Cl₂ (1:1) versetzt und 30 min bei RT gerührt. Der Ansatz wurde mit 10 ml Dioxan verdünnt und im Hochvakuum vom Lösungsmittel befreit. Man erhielt 202 mg (99%) 2-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-ammoniumtetraazadecan))-1,3-dioleoyloxy-propan-tri-trifluoracetat I (zähes, farbloses Öl):

Beispiel 2

Herstellung von 2-L-Alanyl-(1,3-dioleoyloxy)propylamid-trifluoracetat II

4 mmol (756 mg) Boc-L-alanin (M=189.21) und 4.3 mmol (436 mg = 600 μl) Triethylamin (M=101.19, d=0.726), wurden in 10 ml abs. Tetrahydrofuran gelöst und mit Aceton/N₂ (fl.) auf -10°C abgekühlt. Nun wurden 4 mmol (320 μl) Chlorameisensäuremethylester (M=94.50, d=1.228) zugegeben und 30 min bei 0°C gerührt. Nach Zugabe von 5 mmol (456 mg) 2-Amino-1,3-propandiol (M=91.11) wurde noch 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Nach

Entfernen des Tetrahydrofurans am Rotationsverdampfer wurden 50 ml Ethylacetat zugegeben. Die organische Phase wurde mit 5 ml ges. NaHCO₃-Lösung und 10 ml ges. NaCl-Lösung gewaschen und über Na₂SO₄ getrocknet. Nach Einrotieren im Wasserstrahlvakuum wurden letzte Lösungsmittelreste im Ölpumpenvakuum entfernt. Man erhielt 332 mg (32%) 2-BOC-L-Alanyl-(1,3-dihydroxy)propylamid (farbloses Öl).

2.28 mmol (598 mg) 2-BOC-L-Alanyl-(1,3-dihydroxy)propylamid, 5.70 mmol (1.610 g) Ölsäure (M=282.47), 5.70 mmol (1.176 g) Dicyclohexylcarbodiimid (M=206.33) und 0.23 mmol (28 mg) Dimethylaminopyridin (M=122.17) gelöst in 40 ml abs. CH₂Cl₂ wurden 12 h bei RT gerührt. Anschließende Reinigung des Rohprodukts durch Säulenchromatographie (Kieselgel 60) ergab 1.450 g (80%) 2-BOC-L-Alanyl-(1,3-dioleoyloxy)propylamid.

0.89 mmol (702 mg) 2-BOC-L-Alanyl-(1,3-dioleoyloxy)propylamid wurden mit 6 ml TFA/CH₂Cl₂ (1:1) versetzt und 30 min bei RT gerührt. Der Ansatz wurde mit 10 ml Dioxan verdünnt und im Hochvakuum vom Lösungsmittel befreit. Man erhielt 712 mg (99%) 2-L-Alanyl-(1,3-dioleoyloxy)propylamid-trifluoracetat II.

Beispiel 3

Herstellung von 2-(Guanidino-β-alanyl)-1,3-dioleoyloxypropylamid-hydrochlorid III

1.892 g (10 mmol) N-BOC-β-alanin wurden analog zu Beispiel 2 zu 2-BOC-β-Alanyl-1,3-dioleoyloxypropylamid (15% über beide Stufen) umgesetzt. 500 mg (0.64 mmol) 2-BOC-β-Alanyl-1,3-dioleoyloxypropylamid wurden mit 3 ml TFA/CH₂Cl₂ (1:1) versetzt und 30 min bei RT gerührt. Der Ansatz wurde dann mit 50 ml Methylenchlorid verdünnt und mit zwei mal 5 ml ges. NaHCO₃-Lösung extrahiert. Die über Natriumsulfat getrocknete organische Phase wurde am Rotationsverdampfer vom Lösungsmittel befreit und der Rückstand mit 103 mg (0.7 mmol) 1-H-Pyrazol-1-carboxamidin-hydrochlorid und mit 120 μl (0.7 mmol) DIEA in 20 ml DMF gelöst und über Nacht bei RT gerührt. Anschließende Reinigung des Rohprodukts durch Säulenchromatographie (Kieselgel 60) ergab 480 mg (98%) 2-(Guanidino-β-alanyl)-1,3-dioleoyloxypropylamid-hydrochlorid III (zähes Öl).

Beispiel 4

Herstellung von 3β -(N^5 -carbamoyl-(N^1 , N^{10} , N^{14} -ammoniumtetraazadecan))-cholesterol-trihydrochlorid V

610 mg (1.2 mmol) N^1 , N^{10} , N^{14} -tris-BOC-spermin wurden in 10 ml Methylenchlorid gelöst und mit 674 mg (1.5 mmol) Cholesterolchlorformiat und mit 210 μ l (1.5 mmol) NEt₃ versetzt. Der Ansatz wurde für 4 h bei RT gerührt und anschließend säulenchromatographisch gereinigt. Man erhielt 570 mg (52%) 3β -(N^5 -carbamoyl-(N^1 , N^{10} , N^{14} -tris-BOC-tetraazadecan))-cholesterol (farbloser Schaum). 275 mg (0.3 mmol) 3β -(N^5 -carbamoyl-

 $(N^1,N^{10},N^{14}$ -tris-BOC-tetraazadecan))-cholesterol wurden mit 6 ml MeOH (10 mmol HCl enthaltend) versetzt, 30 min bei RT gerührt und im Hochvakuum vom Lösungsmittel befreit. Man erhielt 205 mg (94%) 3 β -(N^5 -carbamoyl-(N^1,N^{10},N^{14} -ammoniumtetraazadecan))-cholesterol-tri-hydrochlorid V (farbloser Feststoff). Auf analoge Weise wurde ausgehend von BOC-Putrescin 3 β -(N-Ammonium-N'-carbamoyl-1,4-diaminobutan)-cholesterol-hydrochlorid VII (farbloser Feststoff) synthetisiert.

Beispiel 5 Herstellung von 3β-Ornithyl-cholesterol-dihydrochlorid VI

997 mg (3 mmol) Di-BOC-Ornithin wurden in 40 ml Methylenchlorid gelöst, mit 1.16 g (3 mmol) Cholesterol, 640 mg (3.1 mmol) DCC, 50 mg DMAP versetzt, und 24 h bei RT gerührt. Es wurde vom ausgefallenen Dicyclohexylharnstoff abfiltriert im Vakuum eingeengt und der Rückstand aus 5 ml Hexan umkristallisiert. Man erhielt 1.62 g (77%) 3β-di-BOC-Ornithyl-cholesterol (farbloser Feststoff). 190 mg (0.27 mmol) 3β-di-BOC-Ornithyl-cholesterol wurden mit 6 ml MeOH (enthielt 10 mmol HCl) versetzt und 60 min bei RT gerührt. Nach Entfernen des Lösungsmittels im Hochvakuum erhielt man 146 mg (94%) 3β-Ornithyl-cholesterol-dihydrochlorid VI (farbloser Feststoff).

Beispiel 6 Herstellung von 6-(3β-Carboxycholesteroyl)-glucosamin-hydrochlorid VIII

279 mg (1 mmol) N-BOC-Glucosamin wurden in 8 ml Pyridin gelöst, mit 449 mg (1 mmol) Cholesterylchlorformiat versetzt und für 24 h bei RT gerührt. Daraufhin wurde im Hochvakuum Pyridin entfernt, in 50 ml Ether aufgenommen und mit 0.01 n HCl extrahiert. Die organische Phase wurde vom Lösungsmittel befreit und der Rückstand säulenchromatographisch (Kieselgel 60) gereinigt. Man erhielt 210 mg (30%) 6-(3β-Carboxycholesteroyl)-N-BOC-glucosamin (farbloser Feststoff). 100 mg (0.15 mmol) 6-(3β-Carboxycholesteroyl)-N-BOC-glucosamin wurden mit 3 ml ml MeOH (enthielt 5 mmol HCl) versetzt und 60 min bei RT gerührt. Nach Entfernen des Lösungsmittels im Hochvakuum erhielt man 95 mg (99%) 6-(3β-Carboxycholesteroyl)-glucosamin-hydrochlorid VIII (farbloses, zähes Öl).

Beispiel 7

216 mg (0.8 mmol) Östron wurden in 10 ml Dioxan gelöst, mit 241 μ l (2 mmol) Diphosgen und 152 μ l (1.2 mmol) Dimethylanilin versetzt und 12 h bei RT gerührt. Daraufhin wurde im Hochvakuum eingeengt und der Rückstand in 15 ml Methylenchlorid gelöst. Die so erhaltene Lösung wurde zu einer Lösung von 300 mg (0.6 mmol) N^1,N^{10},N^{14} -tris-BOC-spermin und 277 μ l (2 mmol) Triethylamin in 5 ml Methylenchlorid zugetropft und 4 h bei RT gerührt. Anschließende säulenchromatographische Reinigung ergab 290 mg (61%) 3-(N^5 -carbamoyl- $(N^1,N^{10},N^{14}$ -tris-BOC-tetraazadecan))-oestron (zähes Öl).

220 mg (0.28 mmol) 3-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-tris-BOC-tetraazadecan))-oestron wurden daraufhin in 5 ml Dioxan gelöst und mit 37 mg (0.96 mmol) Natriumborhydrid versetzt. Nach 2 stündigem Rühren bei RT wurde der Ansatz mit 0.1 N HCl auf pH 6 gebracht und drei mal mit je 50 ml Methylenchlorid extrahiert. Die organischen Phasen wurden über Natriumsulfat getrocknet und am Rotationsverdampfer vom Lösungsmittel befreit. Man erhielt 219 mg (96%) 3-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-tris-BOC-tetraazadecan))-oestradiol (farbloser Schaum). Die Verbindung wird analog dem Beispiel 4 mit MeOH/ HCl zu 3-(N⁵-carbamoyl-(N¹,N¹⁰,N¹⁴-ammoniumtetraazadecan))-oestradiol-tri-hydrochlorid IX umgesetzt.

Beispiel 8

Herstellung von 3-(N,N-dimethylammoniumethylendiamin-N´-carbamoyl)-oestron-hydrochlorid X

541 mg (2 mmol) Östron wurden in 20 ml Dioxan gelöst, mit 603 μl (5 mmol) Diphosgen und 380 μl (3 mmol) Dimethylanilin versetzt und 12 h bei RT gerührt. Daraufhin wurde im Hochvakuum eingeengt und der Rückstand in 15 ml Methylenchlorid gelöst. Diese Lösung wurde mit 800 μl (7.3 mmol) N,N-Dimethylaminoethylendiamin versetzt, 4 h bei RT gerührt und dann mit 100 ml Methylenchlorid verdünnt. Es wurde fünf mal mit je 20 ml 0.01 N HCl extrahiert, die organische Phase über Natriumsulfat getrocknet und vom Lösungsmittel befreit. Anschließende säulenchromatographische Reinigung (Kieselgel 60) ergab 573 mg (68%) 3-(N,N-dimethylammoniumethylendiamin-N'-carbamoyl)-oestron-hydrochlorid X (farbloser Feststoff).

Schema I

Schema II

$$H_{33}C_{17}$$
 O
 $H_{33}C_{17}$
 O
 R
 NH_3
 ^+TFA

H

Schema III

IV

Schema IV

$$H_2N$$
 NH $3 eq (BOC)_2O$ BOCHN NBOC BOCHN NH

$$H_2N$$
 NH_2
 $I \text{ eq (BOC)}_2O$
 NH_2
 $I \text{ eq (BOC)}_2O$
 $I \text$

Schema V

- 1. Dicyclohexylcarbodiimid DMAP, CH₂Cl₂
- 2. HCl, MeOH

VI

Schema VI

Schema VII

Schema VIII

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & \\ \hline \\ Me_2 N & & \\ NH & & \\ \end{array}$$

Patentansprüche

1. Kationische Lipide der allgemeinen Formel I,

$$X \xrightarrow{R_1} (CH_2)_n \xrightarrow{R_1} (CH_2)_m \xrightarrow{R_1} X$$
 $R_2 \xrightarrow{R_1} (CH_2)_n \xrightarrow{N^+} R_2$
 $R_1 \xrightarrow{R_1} (CH_2)_m \xrightarrow{N^+} R_2$
 $R_2 \xrightarrow{R_1} (CH_2)_m \xrightarrow{N^+} R_2$

]

wobei n=2,3,4,6,8 und m=2,3,6,8 sein kann und R_1 = H, CH_3 , CH_2CH_2OH ; R_2 = H, CH_3 , CH_2CH_2OH , $(CH_2)_3N^+(R_1)_3$, R_3 einen geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Rest C_7 - C_{21} , Z = CH_2 , O, NH, Y = CH_2 , O, NH und X = CI, Br, I. CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

2. Kationische Lipide der Formel II,

$$R_2$$
 Z
 Z
 R_2
 R_2
 R_3
 R_2
 R_3

II

wobei R_1 einen aliphatischen, aromatischen oder heteroaliphatischen α -C-Atom-Substituenten der α -Aminosäuren Glycin, Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Phenylalanin, Tyrosin, Prolin, Hydroxyprolin, Serin, Threonin, Cystein, Cystin, Methionin, Tryptophan, Arginin, Lysin, Ornithin, Histidin, R_2 einen geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Rest C_7 - C_{21} , X = C1, Br, I, CH_3COO , CF_3COO , Y = CH_2 , O, NH und Z = CH_2 , O, NH bedeutet.

3. Kationische Lipide der allgemeinen Formel III,

III

wobei R_1 = H, CH_3 , $(CH_2)_3NH_2^+X^-(CH_2)_3NH_3^+X^-$, R_3 = H, $(CH_2)_3NH_3^+X^-$, R_2 einen geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Rest C_7 - C_{21} und X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

4. Kationische Lipide der allgemeinen Formel IV,

wobei n=1-4 sein kann und R einen geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Rest C_7 - C_{21} , Y = CH_2 , O, NH, Z = CH_2 , O, NH und X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

5. Kationische Lipide der allgemeinen Formel V,

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ H \\ H \\ H \end{array}$$

wobei n=2,3,4,6,8 und m=2,3,6,8 sein kann und R_1 = H. CH_3 , CH_2CH_2OH ; R_2 = H, CH_3 , CH_2CH_2OH , $(CH_2)_3N^+(R_1)_3$ und X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

6. Kationische Lipide der allgemeinen Formel VI,

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ H \\ R_{2} \end{array}$$

wobei $R_1 = H$, CH_3 , $(CH_2)_3NH_2^+X^-(CH_2)_3NH_3^+X^-$, $(CH_2)_3NH_3^+X^-$, $R_2 = H$, $(CH_2)_3NH_3^+X^-$ und X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

7. Kationische Lipide der allgemeinen Formel VII,

$$Y-(CH_2)_m-NH$$

VII

wobei m=2-6 sein kann und Y eine Gruppe $N(R)_3^+X^-$ mit R=H, CH_3 , $(CH_2)_2OH$ oder eine Gruppe NH- $C(NH_2^+X^-)NH_2$ mit X=CI, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

8. Kationische Lipide der allgemeinen Formel VIII,

VIII

wobei Y eine Gruppe $N(R)_3^+X^-$ mit R=H, CH_3 , $(CH_2)_2OH$ oder eine Gruppe NH- $C(NH_2^+X^-)NH_2$ mit X=Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

9. Kationische Lipide der allgemeinen Formel IX und X,

wobei n=2,3,4,6,8 und m=2,3,6,8 sein kann und $R_1 = H$, CH_3 , CH_2CH_2OH ; $R_2 = H$, CH_3 , CH_2CH_2OH . $(CH_2)_3N^+(R_1)_3$, R = H, CH_3 , $(CH_2)_2OH$, Y eine Gruppe Carbonyl (=0 (Östron)) oder eine Gruppe OH (Östradiol), Z eine Gruppe $N(R)_3^+X^-$ mit R = H, CH_3 , $(CH_2)_2OH$ oder eine Gruppe NH- $C(NH_2^+X^-)NH_2$ und X = Cl, Br, I, CH_3COO , CF_3COO bedeutet.

Transfektion von MaTu-Zellen





Abb.1

Abb.2






Abb.3

Transfektion von N64-Zellen




Abb.4



30





Abb.5






Abb.6

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶: C07J 41/00, C07C 271/20, 279/14, 237/08, A61K 31/575, 9/127, 31/16, 31/325, 31/155, C12N 15/63

A3

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/05678

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

12. Februar 1998 (12.02.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE97/01669

(22) Internationales Anmeldedatum:

1. August 1997 (01.08.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 31 189.6

2. August 1996 (02.08.96)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MAX-DELBRÜCK-CENTRUM FÜR MOLEKULARE MEDIZIN [DE/DE]; Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).

(71)(72) Anmelder und Erfinder: SCHNEIDER, Manfred [DE/DE]; Triebelsheider Weg 47, D-42111 Wuppertal (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KEIL, Oliver [DE/DE]; Krotscheiderweg 52, D-42327 Wuppertal (DE). RESZKA, Regina [DE/DE]; Goethestrasse 23, D-16341 Schwanebeck (DE). GROTH, Detlef [DE/DE]; Neue Scheune 5, D-14548 Ferch (DE).

(74) Anwalt: BAUMBACH, Fritz; BioTez Berlin-Buch GmbH, Patentstelle, Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE). (81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen

Vor Ablauf der für Anderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 25. Februar 1999 (25.02.99)

(54) Title: NOVEL CATIONIC AMPHIPHILIC LIPIDS FOR LIPOSOMAL GENE TRANSFER

(54) Bezeichnung: NEUARTIGE KATIONISCHE AMPHIPHILE FÜR DEN LIPOSOMALEN GENTRANSFER

(57) Abstract

The synthesis of novel cationic, amphiphilic lipids is disclosed, as well as their use as gene transfer vesicles *in vitro* and *in vivo*. A series of different lipids (diglycerides, steroids) was synthesised by modification with variable cationic molecules (amino acids, biogenic amines). Because of their ability to form complexes with polynucleotides (DNA, RNA, antisense oligonucleotides, ribozymes, etc.), compounds of this type are useful as vectors for gene transfer (transfection).

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Synthese neuartiger kationischer, amphiphiler Lipide und deren Anwendung als Gentransfervesikel in vitro und in vivo. Dazu wurden eine Reihe unterschiedlicher Lipide (Diglyceride, Steroide) durch Modifizierung mit variablen kationischen Molekülen (Aminosäuren, biogene Amine) synthetisiert. Verbindungen dieser Art eignen sich, aufgrund ihrer Fähigkeit mit Polynukleotiden (DNS, RNS, Antisense Oligonukleotide, Ribozyme usw.) zu komplexieren, als Vektoren für den Gentransfer (Transfektion).

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	\mathbf{UG}	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	ľľ	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Колдо	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dānemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

national Application No

PCT/DE 97/01669 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 C07J41/00 C07C271/20 C07C279/14 C07C237/08 A61K31/575 A61K9/127 A61K31/325 A61K31/16 A61K31/155 C12N15/63 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 C07J C07C A61K C12NDocumentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Category 9 Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages P,X WO 97 00241 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH 1.2 ;FERNHOLZ ERHARD (DE); ELTZ HERBERT VON D) 3 January 1997 see figures 3-6 WO 86 04579 A (UNIV LOUVAIN) 2 χ 14 August 1986 see claims χ WO 95 04030 A (COMMW SCIENT IND RES ORG 3 ;WHITTAKER ROBERT GEORGE (AU); BENDER VER) 9 February 1995 see page 8; examples X WO 96 22303 A (COMMW SCIENT IND RES ORG 3 ; WHITTAKER ROBERT GEORGE (AU); BENDER VER) 25 July 1996 see claims; examples -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Х X Patent family members are listed in annex. ° Special categories of cited documents : later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means in the art. document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 04/01/1999 18 December 1998 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016

3

Sánchez García, J.M.

t national Application No PCT/DE 97/01669

		PCI/DE 9/	
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
X	WO 96 18372 A (GENZYME CORP) 20 June 1996 see claims; examples		5
X	WO 94 04545 A (UNIV LEIDEN ;NL HARTSTICHTING (NL); BIESSEN ERICUS ANNA LEONARDUS) 3 March 1994 see page 23, line 15 - line 35		- 6
Х	FR 2 551 758 A (ANVAR) 15 March 1985 see page 11, line 5 - line 15		6
X	WO 96 14831 A (PASTEUR MERIEUX SERUMS VACC ;HAENSLER JEAN (FR); TRANNOY EMMANUELL) 23 May 1996 see figure 1		7
A	EP 0 038 750 A (MERCK & CO INC) 28 October 1981 see claims		8
X	US 4 584 136 A (YOSHIDA MASARU ET AL) 22 April 1986 see column 3		9
	*		

Information on patent family members

i :ational Application No PCT/DE 97/01669

Pá	atent document		Publication		Patent family	Publication
	in search report		date		member(s)	date
WO	9700241	A	03-01-1997	DE	19521412 A	19-12-1996
				AU	6355396 A	15-01-1997
				CA	2224566 A	03-01-1997
				CN	1193316 A	16-09-1998
				EP	0835238 A	15-04-1998
				NO	975853 A	16-02-1998
WO	8604579	Α	14-08-1986	LU	85757 A	02-09-1986
				DK	437586 A	12-09-1986
				EP	0250403 A	07-01-1988
				FI	871270 A	23-03-1987
				JP	63501498 T	09-06-1988
WO	9504030	Α	09-02-1995	AU	683289 B	06-11-1997
				AU	7342094 A	28-02-1995
				CA	2167818 A	09-02-1995
				CN	1128531 A	07-08-1996
				EP	0712389 A	22-05-1996
				FI	960504 A	02-02-1996
				JP	9501655 T	18-02-1997
				NO	960389 A	30-01-1996
				NZ	269773 A	24-11-1997
	··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··	·		U\$ 	5792786 A	11-08-1998
WO	9622303	Α	25-07-1996	AU	4426996 A	07-08-1996
				CA	2210500 A	25-07-1996
				EP	0804459 A	05-11-1997
				FI	973 0 02 A	19-08-1997
			و برسور نامِين سندي سيدي كلفة عشد كلفة عشد كلفة عليه	NO	973283 A	08-09-1997
WO	9618372	Α	20-06-1996	US	56 500 96 A	22-07-1997
				US	5747471 A	05-05-1998
				AU	4516196 A	03-07-1996
				CA	2205968 A	20-06-1996
				EP	0 7990 59 A	08-10-1997
				JP	10510813 T	20-10-1998
				US	5767099 A	16-06-1998
				US	5840710 A	24-11-1998
				US	5719131 A	17-02-1998
				US	5783565 A	21-07-1998
WO	9404545	Α	03-03-1994	NL	9201440 A	01-03-1994
				AT	168694 T	15-08-1998
				AU	674160 B	12-12-1996
				AU	4835593 A	15-03-1994
				DE	69319912 D	27-08-1998
				EP 10	0655070 A	31-05-1995
			was now, you was said the cost that with such thin said they said they said.	JP	8502726 T	26-03-1996
FR	2551758	Α	15-03-1985	AU	588219 B	14-09-1989
				AU	3200384 A	21-02-1985
				CA	1257584 A	18-07-1989
				DK	393184 A	17-02-1985
				EP	0139554 A	02-05-1985
				JP	60126297 A	05-07-1985
	in cases annin seems from skipes relaid solds skills (1908) (1908)	eccol Posto cides was well a	and the same and principle with the control of the same of the sam	US	4663311 A	05-05-1987
	9614831	Α	23-05-1996	FR	2726764 A	15-05-1996

Information on patent family members

in ational Application No PCT/DE 97/01669

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9614831	Α	<u> </u>	AU CA	4180296 A 2205022 A	06-06-1996 23-05-1996
			CN	1168629 A	23-05-1990
			EP	0793484 A	10-09-1997
EP 0038750	Α	28-10-1981	US	4368190 A	11-01-1983
			AT	23537 T	15-11-1986
			CA	1174232 A	11-09-1984
			DK	172481 A	18-10-1981
			GR	76828 A	04-09-1984
			JP	56164196 A	17-12-1981
			PT	72866 B	25-11-1985
US 4584136	. A	22-04-1986	JP	61007292 A	13-01-1986

nationales Aktenzelchen
PCT/DE 97/01669

	the second secon		
A. KLASSI IPK 6		'14 C07C237/08	
		325 A61K31/155	C12N15/63
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	All and the second seco	4
Recherchier IPK 6	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo C07J C07C A61K C12N	ole)	
11 % 0	CO/O CO/C MOIR CIZN		
Pacharabian	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	we is disposant of the machantain de	an Cabiata fallan
necherchier	te aber nicht zum mindesprüfsich gehörende Verollentlichungen, so	weil diese unter die recherchierte	n Gebiele laken
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. ve	rwendete Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Tei	lle Betr. Anspruch Nr.
P,X	WO 97 00241 A (BOEHRINGER MANNHEI	M GMRH	1,2
','	;FERNHOLZ ERHARD (DE); ELTZ HERBE		± , =
	3. Januar 1997		
	siehe Abbildungen 3-6 		
χ	WO 86 04579 A (UNIV LOUVAIN)		2
	14. August 1986		
	siehe Ansprüche		
X	WO 95 04030 A (COMMW SCIENT IND R		3
	;WHITTAKER ROBERT GEORGE (AU); BE	ENDER VER)	
	9. Februar 1995 siehe Seite 8; Beispiele		
X	WO 96 22303 A (COMMW SCIENT IND R		3
	;WHITTAKER ROBERT GEORGE (AU); BE 25. Juli 1996	INDER VER)	
	siehe Ansprüche; Beispiele		
		-/	·
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfar	milie
	 Kategorien von angegebenen Veröttentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 	oder dem Prioritätsdatum ve	nach dem internationalen Anmeidedatum röffentlicht worden ist und mit der
	icht als besonders bedeutsam anzusenen ist Dokument, das jedoch erst am oder inach dem internationalen		ondern nur zum Verständnis des der n Prinzips oder der ihr zugrundellegenden
Anmei	dedatum veröffentlicht werden ist	"X" Veröffentlichung von besonde	erer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung Veröffentlichung nicht als neu oder auf
echain	en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angedehen ist (wie	orfinderscher Tätickeit herri	hand hatrachtat warden
ausget	führt)	kann nicht als auf eningensc	cher Tätigkeit beruhend betrachtet ichung mit einer oder mehreren anderen
eine B	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser Ka diese Verbindung für einen F	ategorie in Verbindung gebracht wird und
	ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"&" Veröffentlichung, die Mitglied	_
Datum des /	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internati	onalen Recherchenberichts
18	8. Dezember 1998	04/01/1999	
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevolimächtigter Bedienstet	er
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Sánchez Garc	efa. J.M.

3

1: Nationales Aktenzeichen
PCT/DE 97/01669

		PCT/DE 9	//01669
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 96 18372 A (GENZYME CORP) 20. Juni 1996 siehe Ansprüche; Beispiele		5
X	WO 94 04545 A (UNIV LEIDEN ;NL HARTSTICHTING (NL); BIESSEN ERICUS ANNA LEONARDUS) 3. März 1994 siehe Seite 23, Zeile 15 - Zeile 35		6
X	FR 2 551 758 A (ANVAR) 15. März 1985 siehe Seite 11, Zeile 5 - Zeile 15		6
X	WO 96 14831 A (PASTEUR MERIEUX SERUMS VACC ;HAENSLER JEAN (FR); TRANNOY EMMANUELL) 23. Mai 1996 siehe Abbildung 1		7
A	EP 0 038 750 A (MERCK & CO INC) 28. Oktober 1981 siehe Ansprüche		8
X	US 4 584 136 A (YOSHIDA MASARU ET AL) 22. April 1986 siehe Spalte 3		9

3

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/DE 97/01669

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9700241 A	03-01-1997	DE 19521412 A AU 6355396 A CA 2224566 A CN 1193316 A EP 0835238 A NO 975853 A	19-12-1996 15-01-1997 03-01-1997 16-09-1998 15-04-1998 16-02-1998
WO 8604579 A	14-08-1986	LU 85757 A DK 437586 A EP 0250403 A FI 871270 A JP 63501498 T	02-09-1986 12-09-1986 07-01-1988 23-03-1987 09-06-1988
WO 9504030 A	09-02-1995	AU 683289 B AU 7342094 A CA 2167818 A CN 1128531 A EP 0712389 A FI 960504 A JP 9501655 T NO 960389 A NZ 269773 A US 5792786 A	06-11-1997 28-02-1995 09-02-1995 07-08-1996 22-05-1996 02-02-1996 18-02-1997 30-01-1996 24-11-1997 11-08-1998
WO 9622303 A	25-07-1996	AU 4426996 A CA 2210500 A EP 0804459 A FI 973002 A NO 973283 A	07-08-1996 25-07-1996 05-11-1997 19-08-1997 08-09-1997
WO 9618372 A	20-06-1996	US 5650096 A US 5747471 A AU 4516196 A CA 2205968 A EP 0799059 A JP 10510813 T US 5767099 A US 5840710 A US 5719131 A US 5783565 A	22-07-1997 05-05-1998 03-07-1996 20-06-1996 08-10-1997 20-10-1998 16-06-1998 24-11-1998 17-02-1998 21-07-1998
WO 9404545 A	03-03-1994	NL 9201440 A AT 168694 T AU 674160 B AU 4835593 A DE 69319912 D EP 0655070 A JP 8502726 T	01-03-1994 15-08-1998 12-12-1996 15-03-1994 27-08-1998 31-05-1995 26-03-1996
FR 2551758 A	15-03-1985	AU 588219 B AU 3200384 A CA 1257584 A DK 393184 A EP 0139554 A JP 60126297 A US 4663311 A	14-09-1989 21-02-1985 18-07-1989 17-02-1985 02-05-1985 05-07-1985 05-05-1987
WO 9614831 A	23-05-1996	FR 2726764 A	15-05-1996

Angaben zu Verötfentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

etionales Aktenzeichen
PCT/DE 97/01669

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
WO	9614831	A		AU CA CN EP	4180296 A 2205022 A 1168629 A 0793484 A	06-06-1996 23-05-1996 24-12-1997 10-09-1997
EP	0038750	А	28-10-1981	US AT CA DK GR JP PT	4368190 A 23537 T 1174232 A 172481 A 76828 A 56164196 A 72866 B	11-01-1983 15-11-1986 11-09-1984 18-10-1981 04-09-1984 17-12-1981 25-11-1985
US	4584136	Α	22-04-1986	JP	61007292 A	13-01-1986